



ČESKÁ SPOLEČNOST ALERGOLOGIE A KLINICKÉ IMUNOLOGIE

Vážený pán
Doc.MUDr.Jaroslav Čermák, CSc.
předseda České hematologické společnosti ČLS JEP
ÚHKT
U nemocnice 1
128 20 Praha 1

věc: dárcovství krve alergiky

Praha, 23.9.2009

Vážený pane předsedo,

na zářijové schůzi výboru naší odborné společnosti jsme mimo jiné také diskutovali problematiku dárcovství krve alergiky. Dle našich informací jsou v ČR určité oblasti, kde transfúzní stanice tyto nemocné zcela paušálně odmítají a jinde existence alergie dárcovství krve nebrání. A naši nemocní chtějí od nás slyšet vyjádření.

Obracím se na Vás proto s dotazem, jaké jsou současná pravidla v této oblasti a zda existence alergie je kontraindikací dárcovství krve. Pokud by tomu tak skutečně bylo, jednalo by se o vyřazení 20 procent lidí z možnosti darovat krev, protože v současnosti je procento alergiků v naší populaci takto vysoké.

Děkuji za odpověď.

S pozdravem



ČESKÁ SPOLEČNOST ALERGOLOGIE
A KLINICKÉ IMUNOLOGIE
předseda

Doc.MUDr.Vít Petrů, CSc., předseda ČSAKI
Centrum alergologie a klinické imunologie
Nemocnice Na Homolce
Roentgenova 2, 150 30 Praha 5
Tel.+420257272017, vit.petr@homolka.cz

Dopis předán doc. Čermákem předsedovi STL dne 26.11.2009 při zkoušení atestací



Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně

Společnost pro transfuzní lékařství



V Hradci Králové, 27. listopadu 2009

Vážený pan
Doc. MUDr. Vít Petrů, CSc.
předseda ČSAKI

Věc: Dárcovství krve a krevních složek u alergiků

Vážený pane předsedo,

při včerejším zkoušení atestace z hematologie a transfuzního lékařství mi p. doc. Čermák předal žádost Vaší společnosti o odpověď s tím, že otázka patří do působnosti STL.

Společnost pro transfuzní lékařství ČLS ve svých standardech, která jsou **minimálními požadavky** na dárce krve a krevních složek a jsou v souladu s českou a evropskou legislativou, doporučuje následující:

Alergie

Dočasné vvrázení z odběrů

- pylová alergie, senná rýma: vyloučení ve fázi akutních projevů a při hyposenzibilizaci
- alergie na léky: vyloučení ve fázi projevů

Trvalé vyloučení

- těžké průduškové astma
- polyvalentní alergie s těžkými klinickými projevy či rozsáhlým spektrem alergenů
- závažná anafylaktická reakce v anamnéze

Lze přijmout: 72 hod. po poslední hyposenzibilizační dávce či po léčbě, pokud nejsou nežádoucí projevy

dlouhodobá profylaxe antiastmatiky a/nebo antihistaminiky

zdroj: www.transfuznispolecnost.cz odkaz dokumenty – doporučné postupy - Doporučení STL2007 03 Zpusobilost darce

Jednotlivá transfuzní oddělení (ZTS - zařízení transfuzní služby dle zák. č. 378/2007 Sb. –zákon o léčivech a vyhl. č. 143/2008 Sb. -vyhláška o lidské krvi) mají vypracovány svoje vlastní směrnice pro propouštění dárce k odběru, ve kterých musí být dodrženy tyto minimální požadavky. V pravomoci ZTS však je některá doporučení zpřísnit, což vysvětluje odmítání dárců s alergiemi na některých transfuzních odděleních. Je jasné, že toto individuální zpřísnňování vede

k Vámi kritizovanému nejednotnému přístupu k dárcům v ČR. Výbor STL však nemůže zpřísnující podmínky jednotlivých ZTS zrušit.

Vážený pane předsedo, pokud byste měli návrhy na úpravu výše uvedených minimálních požadavků týkajících se alergie, rád o nich s Vámi budu jednat.

S přátelským pozdravem,



MUDr. Vít Řeháček
předseda STL

**ČESKÁ LÉKAŘSKÁ SPOLEČNOST
SPOLEČNOST
PRO
TRANSFÚZNÍ LÉKAŘSTVÍ**

kontaktní údaje:
Fakultní nemocnice Hradec Králové
transfúzní oddělení
Sokolská 581
500 05 Hradec Králové
tel.: 495833445
e-mail: rehacekv@lfhk.cuni.cz